

# Ohrození muži

Kulanga Miroslav, Sedláková Jana

*Očná klinika Kulanga, Poprad*

## Úvod

Na liečbu erektilnej dysfunkcie sú dnes okrem známeho sildenafilu dostupné ďalšie tri inhibítory fosfodiesterázy 5 (tadalafil, avanafil, vardenafil). Blokovaním enzýmu fosfodiesterázy spôsobujú vazodilatáciu, čím dosahujú svoj účinok, ale efektívne znižujú aj krvný tlak a tým perfúziu. Fosfodiesterázy sú prítomné aj v očných tkanivách, najmä v sietnici. Preto dokážu vyvolať rôzne zrakové poruchy a dokonca vyvolať aj neareriitickú prednú ischemickú neuropatiu zrakového nervu (nAION).

## Kazuistika

Predstavujeme prípad 48 ročného muža, ktorý utrpel bilaterálnu nAION po užívaní liekov na erektilnú dysfunkciu. Išlo o náhodný nález v rámci preventívnej prehliadky, pretože poškodenie bolo len sektoriálne a mierne. Minimálne 40% prípadov je bilaterálnych. Včasné odhalenie príčiny nAION už pri prvej epizóde môže zabrániť postihu aj druhého oka. Dôležité je však opýtať sa aktívne na užívanie týchto liekov, pretože málokto pacient sa o tom zmieni sám od seba.

## **Záver**

A najdôležitejšie je myslieť na tieto lieky ako možnú príčinu porúch zraku alebo nAION u mužov v mladom alebo strednom veku.

**korešpondenčný E-mail:** [miroslav@kulanga.sk](mailto:miroslav@kulanga.sk)